

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**Bronchipret TP comprimate filmate**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să luați Bronchipret TP cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 14 zile de tratament.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Bronchipret TP și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Bronchipret TP
3. Cum să utilizați Bronchipret TP
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Bronchipret TP
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE BRONCHIPRET TP ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Pentru tratamentul bronșitei acute, tusei și răcelii caracterizate prin congestie (inflamație) excesivă a mucoasei căilor respiratorii. Se administrează la adolescenți cu vârsta peste 12 ani și la adulți.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI BRONCHIPRET TP**Nu utilizați Bronchipret TP**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la ciuboșica-cucului, cimbru sau alte *Lamiaceae (Labiatae)*, mesteacăn, pelin, țelină sau la oricare dintre celelalte componente ale Bronchipret TP.

Aveți grijă deosebită când utilizați Bronchipret TP

Adresați-vă unui medic dacă simptomele persistă mai mult de două săptămâni sau dacă observați simptome cum sunt: dificultăți de respirație, febră sau spută purulentă și cu sânge.

Deoarece nu există date suficiente privind utilizarea acestui preparat la copii, Bronchipret TP nu trebuie administrat la copii cu vârsta sub 12 ani.

Utilizarea altor medicamente

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați nu trebuie să utilizați Bronchipret TP.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Bronchipret TP nu influențează conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor.

Informații importante privind unele componente ale Bronchipret TP

Bronchipret TP conține lactoză și glucoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI BRONCHIPRET TP

Utilizați Bronchipret TP așa cum este indicat în acest prospect. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dacă nu a fost prescris altfel, la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani se administrează câte un comprimat filmat de 3 ori pe zi.

Luați Bronchipret TP fără să le mestecați înainte de mese cu lichid suficient (de preferat un pahar cu apă).

Cât timp trebuie să utilizați Bronchipret TP

Durata tratamentului depinde de evoluția afecțiunii dumneavoastră. Vă rugăm să țineți cont de informațiile de la subpunctul ” ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI BRONCHIPRET TP”.

Dacă ați utilizat mai mult decât trebuie din Bronchipret TP

Până în prezent nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu preparate din părți aeriene de cimbru și rădăcină de ciuboțica-cucului.

În caz de supradozaj sever pot să apară tulburări gastrice, vărsături și posibil diaree. În acest caz, vă rugăm să vă adresați medicului. El poate decide în privința măsurilor necesare.

Dacă ați uitat să utilizați Bronchipret TP

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată, doar continuați să luați medicamentul așa cum vi s-a prescris de către medicul dumneavoastră sau conform instrucțiunilor de administrare.

Dacă încetați să utilizați Bronchipret TP

Încetarea tratamentului cu Bronchipret TP se poate face în deplină siguranță.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Bronchipret TP poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele categorii de frecvență sunt folosite pentru a evalua reacțiile adverse:

Foarte frecvente:	afectează mai mult de 1 din 10 pacienți
Frecvente:	afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți
Mai puțin frecvente:	afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți

Rare:	afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți
Foarte rare:	afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți

Reacțiile adverse foarte rare

Reacții de hipersensibilitate cum sunt: dificultate în respirație, erupții trecătoare pe piele, urticarie sau umflarea feței, gurii și/sau gâtului.

Reacțiile adverse mai puțin frecvente

Tulburări gastro-intestinale cum sunt: crampe intestinale, greață, vărsături și diaree.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Întrerupeți administrarea medicamentului și adresați-vă unui medic dacă manifestați reacții adverse. Medicul va decide asupra cât de grave sunt aceste reacții adverse și măsurile care trebuie luate.

În cazul apariției primelor semne ale unei reacții de hipersensibilitate se oprește administrarea de Bronchipret TP.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BRONCHIPRET TP

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați Bronchipret TP după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Bronchipret TP

Un comprimat filmat Bronchipret TP conține:

Substanțele active sunt:

60 mg extract uscat din rădăcină de ciuboțica-cucului (5,3-7,8 : 1), solvent de extracție etanol 47,4% (V/V);

160 mg extract uscat din cimbru părți aeriene (4-8 : 1), solvent de extracție etanol 70% (V/V).

Celelalte componente sunt:

Nucleu - celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, sirop de glucoză, substanță uscată, dioxid de siliciu coloidal anhidru, crospovidonă, povidonă K25, talc, stearat de magneziu; film - hipromeloză, poliacrilat dispersie 30% (substanță uscată), talc, dioxid de titan (E 171), propilenglicol, aromă de mentă, riboflavină (E 101), cupru - clorofilină (E 141), dextroză, zaharină sodică, dimeticonă.

Cum arată Bronchipret TP și conținutul ambalajului

Comprimate filmate de culoare verde, rotunde, biconvexe, semiopace.

Cutie conținând 20, 50 și 100 de comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Informații suplimentare

Notă pentru pacienții cu diabet zaharat:

Un comprimat filmat Bronchipret TP conține în medie 0,02 unități glucidice de carbohidrați.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

BIONORICA SE

Kerschensteiner str. 11-15, 92318 Neumarkt

Germania

Telefon +49 9181 / 231-90

Fax +49 9181 / 231-265

e-mail: info@bionorica.de

Acest prospect a fost aprobat în Iulie 2011